



分娩後、乳牛の立ち上がりをよくするにはどうしたらいいの？

その
答えは

バイパスリジン製剤

AjiPro[®]-L

Rumen Protected Lysine



元気が
出ない…

分娩後はケトosisになりやすい。

乳の出が
伸び悩む…

泌乳初期は、調子が悪いと乳量
立ち上がりにくい。

食欲が
出ない…

分娩前後はDMIが低下しがち。

元気のカギは

アミノ酸バランスの改善

泌乳初期から
調子がいいよ！



乾乳後期

AjiPro[®]-L 給与

分娩

分娩後の給与もおすすめ


分娩前

タンパク不足を
解消して、
目指せ！高泌乳

分娩後

◆乳量が増加
◆血中ケトン体が
上昇しにくい

分娩前後に DMI が増加




製品に関する
お問い合わせ先

味の素ヘルシーサプライ株式会社 アミノ酸営業本部 営業部

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目19番8号 TEL: 03-3563-7578 FAX: 03-3563-3221
HP: <http://www.ahs.ajinomoto.com/> E-mail: shiryou_ahs@ajinomoto.com

分娩後は体脂肪だけでなく筋肉を削って体タンパクも動員




分娩後1週間で約30kgの筋肉を失うことも…
近年の研究では乾乳後期のタンパク推奨量は上昇

泌乳に向けたタンパク蓄積を!!

	過去	現在
代謝タンパク	1,080g	1,300g~1,400g
リジン(代謝タンパク中)	75g	90~97g


実例①；分娩前後のDMI低下を抑制

※乾乳後期21日間にAjiPro[®]-L70g給与(分娩後は給与なし)



実例②；分娩後の乳量増加

※乾乳後期21日間にAjiPro[®]-L60g給与(分娩後は給与なし)



◆ 給与量の目安

乾乳後期牛に対し40-80g/日・頭

※給与量は現状の飼料設計中の代謝リジン量により決定してください